


## ElectroPlus™

**Portions:** Powder

**Saveur:** Lemonade

**Format:** 30 - 5.56 g (0.2 oz) Paquets



Information par portion	Quantité
Portion (3 paquets)	16,68 g
Portions par Contenant	10
Calories	30
Glucides	6 g

Ingrédients Médicinaux	Par Paquets (5,56 g)	Par Portion (16,68 g)
Acide L-Malique	500 mg	1 500 mg
Taurine	500 mg	1 500 mg
Chlorure (chlorure de sodium)	270 mg	810 mg
Sodium (chlorure de sodium)	180 mg	540 mg
Alanyl-L-Glutamine	150 mg	450 mg
Magnésium (diglycinate de magnésium)	150 mg	450 mg
Vitamine C (acide ascorbique)	120 mg	360 mg
Potassium (phosphate de dipotassium)	100 mg	300 mg
Calcium (citrate de calcium)	50 mg	150 mg
Acide panthothénique (D-panthothénate de calcium)	28 mg	84 mg
Vitamine E (acetate de d-apha tocophéryle)	20,1 mg AT	60,3 mg AT
Phosphore (phosphate de dipotassium)	20 mg	60 mg
Niacine (niacinamide)	10 mg	30 mg
Riboflavine	5 mg	15 mg
Vitamine B <sub>6</sub> (pyridoxine HCL)	5 mg	15 mg
Thiamine (chlorhydrate de thiamine)	2 mg	6 mg

Chrome (picolinate de chrome)	83 mcg	249 mcg
-------------------------------	--------	---------

**Ingrédients Non Médicinaux:** Acide citrique, saveurs naturelles, et rebaudioside A (*stevia rebaudioside*).

**Posologie Recommandée:** Les adultes mélangent 3 paquets dans 1 litre d'eau, boivent de litre de solution 10-15 minutes avant l'exercice et toutes les 20 minutes pendant l'exercice, en petites quantités à intervalles réguliers. Prendre avec de la nourriture et quelques heures avant ou après la prise d'autres médicaments ou produits de santé naturels.

**Indication Recommandée:** Aide à maintenir un équilibre électrolytique et une fonction musculaire normaux.

**Précautions:** Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez, avec d'autres suppléments potassiques ou des substituts de sel contenant du potassium. Assurez-vous de boire suffisamment de liquide avant, pendant et après l'exercice. Si vous avez une maladie cardiovasculaire, rénale ou un diabète, consultez un professionnel de la santé avant de l'utiliser. Si vous présentez des signes de déshydratation et/ou un déséquilibre électrolytique, tels que confusion, vertiges, irritabilité, maux de tête, nausée, omissements, faiblesse pendant l'exercice/l'utilisation de ce produit, arrêtez l'exercice/ l'utilisation et consultez un professionnel de la santé. Peut causer des troubles gastrointestinaux. Pour usage occasionnel seulement. Consulter un professionnel de la santé pour un usage au-delà de 6 mois.

**Ce produit est non-OGM, sans gluten, et végétarien.**

**Ne pas utiliser si l'emballage est déchiré ou ouvert.**