



Licorice Plus™

Dispose d'un mélange d'herbes de réglisse et d'ashwagandha

Portions: Array

Saveur:

Format: 60 Comprimés

Ingrédients Médicinaux	Quantité
Chaque comprimé contient:	
Réglisse (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) extrait de racine standardisé à 25% de acide glycyrrhizique	300 mg
Décoction à 4:1 de:	250 mg
Rehmannia (<i>Rehmannia glutinosa</i>) (racine) 125 mg,	
Igname de Chine (<i>Dioscorea oppositifolia</i> L.) (racine) 125 mg	
Ashwagandha (extrait 15:1) racine de <i>Withania somnifera</i> équivalent à 750 mg d'ashwagandha	50 mg

Ingrédients Non Médicinaux: Cellulose, phosphate dicalcique, croscarmellose sodique, acide stéarique (végétal), dioxyde de silicium, et enrobage (hypromellose, hydroxypropylcellulose, et triglycérides à chaîne moyenne).

Posologie Recommandée: Adultes prendre 1 comprimé par jour ou selon les indications de votre professionnel de la santé.

Indication Recommandée: *Glycyrrhiza glabra* est traditionnellement utilisé en phytothérapie comme expectorant pour aider à soulager les affections pulmonaires, telles que les catarrhes d'accumulation de mucus, la toux et la bronchite

Précautions: Ne pas utiliser si vous souffrez d'hypokaliémie, d'hypertension artérielle, de troubles rénaux ou cardiovasculaires ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Ne pas utiliser si vous prenez des diurétiques thiazidiques, des glycosides cardiaques, des corticostéroïdes, des laxatifs stimulants ou d'autres médicaments susceptibles d'aggraver le déséquilibre électrolytique. Consulter un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous souffrez d'un trouble hépatique, si les symptômes persistent ou s'aggravent, ou si de nouveaux symptômes se développent. Certaines personnes peuvent éprouver de la somnolence. Faites preuve de

prudence si vous utilisez de la machinerie lourde, conduisez un véhicule à moteur ou participez à des activités nécessitant une vigilance mentale. Éviter de prendre avec de l'alcool ou des produits qui causent de la somnolence. Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation au-delà de 4 à 6 semaines. Pour une utilisation prolongée, consulter un professionnel de la santé.