



## CandiBactin-BR™

**Portions:** Tablets

**Saveur:** no flavor

**Format:** 90 Comprimés

Ingrédient	Quantité
Berbérine (Chlorhydrate de Berbérine)	180,9 mg
Un extrait de 4:1:	150 mg
Coptide Chinois ( <i>Coptis chinensis</i> ) (racine et rhizome) 45 mg, Scutellaire du Lac Baàǰkal ( <i>Scutellaria baicalensis</i> ) (racine) 26,25 mg, Phellondendron ( <i>Phellodendron chinense</i> ) (cortex) 26,25 mg, Gingembre Commun ( <i>Zingiber officinale</i> ) (rhizome) 22,5 mg, Réglisse de l'Oural ( <i>Glycyrrhiza uralensis</i> ) (racine) 15 mg, Rhubarbe de la Turquie ( <i>Rheum officinale</i> ) (racine et rhizome) 15 mg	
Mahonia à Feuilles de Houx (extrait 4:1) racine de <i>Berberis aquifolium</i> équivalent à 140 mg de mahonia à feuilles de houx	35 mg
Coptide Chinois (extrait 12:1) racine et rhizome de <i>Coptis chinensis</i> équivalent à 180 mg de coptide chinois	15 mg

**Ingrédients Non Médicinaux:** Cellulose, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, acide stéarique (végétal), stéarate de magnésium (végétal), et enrobage (hypromellose, hydroxypropylcellulose, et triglycérides à chaîne moyenne).

**Posologie Recommandée:** Prendre 1 comprimé 3 fois par jour ou selon les indications de votre professionnel de la santé.

**Indication Recommandée:** Chlorhydrate de Berbérine, *Coptis chinensis*, *Scutellaria baicalensis*, *Phellodendron chinense* et *Rheum officinale* aident à alléger les troubles associés à une diarrhée légère.

**Précautions:** Réservé aux adultes. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas prendre si vous êtes enceinte ou vous allaitez; durant les périodes menstruelles; si vous prenez de la cyclosporine; si vous suivez un traitement par corticoïdes; si vous souffrez de distension et de plénitude de la poitrine et l'abdomen; si vous vomissez; si vous souffrez d'œdème, d'hypertension, d'hypokaliémie, de troubles cholestatiques, d'une cirrhose du foie, d'une insuffisance rénale chronique ou d'une insuffisance cardiaque congestive, d'hypoglycémie ou d'hypotension. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser si vous souffrez d'une maladie chronique de la peau, prenez des médicaments sous ordonnance, ou si les symptômes persistent ou s'aggravent. L'hypersensibilité peut se produire; si des signes d'allergie ou d'éruption cutanée apparaissent, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé. Consulter un professionnel de la santé pour un usage au-delà de 3 semaines. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est absent.

**Ce produit est non-OGM, sans gluten, et végétarien.**