

Seroyal 
 Made in Belgium by UNDA
 Dist. by Seroyal International
 Richmond Hill, ON L4C 0L8

V1.0

BARCODE LOCATION
 883196 30821

10 Tablets | Comprimés

MUCO COCCINUM®

NPN 80032574

Nosode Preparation for the relief of cold and flu symptoms. Nosode Preparation to be used on the advice of your healthcare practitioner. Préparation de nosodes aidant à soulager les symptômes du rhume et de la grippe. Préparation de nosodes à être utilisée sur l'avis de votre praticien.

 **plex**

MUCO COCCINUM®

 **plex**

Risk Information: If symptoms persist or worsen, consult your healthcare practitioner. If you are pregnant or breastfeeding, do not use, unless directed by your healthcare practitioner. This product is not intended to be an alternative to vaccination.

Safety-sealed for your protection and for product freshness. Do not use if the blister pack has been tampered with. Store in a cool, dry place.

Posologie : Adultes et adéscentes (12 ans et plus) : Dégager le comprimé du paquet et le porter directement sur la langue, ne pas avaler mais le laisser fondre lentement, sans le croquer. **Posologie en phase aiguë :** Dès l'apparition des symptômes, prendre un comprimé, le plus tôt possible. Si les symptômes persistent, prendre un comprimé deux ou trois fois dans la journée, deux ou trois jours ou selon l'avis de votre praticien. **Mention des risques :** Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consulter votre praticien. Ne pas utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez, sauf sur l'avis de votre praticien. Ce produit n'est pas une alternative à la vaccination. **Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la fraîcheur du produit.** Ne pas utiliser si la plaquette alvéole a été endommagée. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité.

Each Tablet Contains/ Chaque comprimé contient:
 Influenzium 200K
 Mucosa purinorea 200K
 Micrococcus californicus (Mucicola) 200K
 Micrococcus tetragenus (Peptostreptococcus tetradus) 200K

Non-Medical Ingredients: Xylitol, carmellose sodium, lactose

Source Information:
 monohydrate, magnesium stearate

Ingredients non médicaux: Xylitol, carmellose de sodium, lactose monohydraté, stéarate de magnésium

Renseignements sur la matière d'origine:
<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mpps/prodatur/index-eng.php>

Renseignements sur la matière d'origine:
<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mpps/prodatur/index-fra.php>

Recommended Dose: Adults and Adolescents (12 years and older): Press the tablet out of the blister and put it on the tongue, do not swallow but let it melt slowly without crushing.

Adulte Dosage: At the first sign of symptoms, take one tablet as early as possible. If symptoms persist, take one tablet two or three times during the day.

General Dosing: Take one tablet in the morning and in the evening for two to three days or as recommended by your healthcare practitioner.

Lot

Exp.